


CUESTIONES A CONSIDERAR EN

EL TRANSPORTE DE ANIMALES LECHEROS




Tome decisiones de manera oportuna y eficiente. Priorice siempre el bienestar del animal.

QUÉ HACER


- ✓ Trate, sacrifique o practique eutanasia a los animales con rapidez. Separe del resto del rebaño a los animales enfermos, heridos o que no puedan caminar.
- ✓ Contrate una empresa con certificación de BQA para transporte de animales que conozca las expectativas de cuidado de los animales y les brinde transporte seguro y cómodo. Para certificarse, visite: www.bqa.org.
- ✓ Retrase el transporte de los animales que se vean exhaustos o deshidratados. Las vacas que sufren estrés o agotamiento por calor pueden que jadeen con la boca abierta y sean reacias a moverse. Transporte al animal cuando esté descansado, alimentado y rehidratado.
- ✓ A las vacas que estén lactando, ordéñelas justo antes de transportarlas.

NO TRANSPORTE ANIMALES

- ✗ Que no puedan caminar.
- ✗ Con fracturas óseas en las miembros o lesiones en la columna.
 - A los animales con fracturas recientes no relacionadas con la movilidad se los debe sacrificar y transportar a una planta de empaquetado o procesamiento.
- ✗ Hasta haber cumplido con todos los períodos correspondientes de retiro para leche y carne. Consulte los períodos de retiro en el **Manual de prevención de residuos de medicamentos en la leche y la carne de FARM**.
- ✗ Con el cuerpo en malas condiciones, por lo general con una puntuación de condición corporal inferior a 2:



PUNTUACIÓN 1



PUNTUACIÓN 2

- ✗ Con afecciones que pongan en riesgo su bienestar y hagan improbable el que superen la inspección previa a la matanza, incluidas, entre otras:
 - Peso excesivamente bajo
 - Cáncer de ojo
 - Ceguera en ambos ojos
 - Fiebre superior a los 103 °F
 - Residuos de fármacos
 - Peritonitis
 - Heridas abiertas visibles
 - Síntomas sospechosos en el sistema nervioso central
 - Fracturas o cojera (*puntuación superior a 2 según el sistema de puntuación de locomoción de FARM*)
 - Prolapsos no reducidos
 - Vacas que estén pariendo o sea muy probable que paran durante el transporte
 - Ubre distendida que cause dolor y problemas de desplazamiento

Si no está seguro de que un animal cumpla con las condiciones para transportarlo, consulte siempre a su veterinario. Y recuerde que nunca se tolera el maltrato, ni antes ni durante el transporte.

En la creación del presente recurso colaboraron las siguientes organizaciones:

