Alltech®
SOPORTE ON-FARM

Buenas Prácticas en la Sala de Ordeña

Mueva las Vacas

Mueva las vacas de manera tranquila y calmada. Si maltrata, asusta o apura a las vacas, el proceso de liberación de leche puede verse alterado.
¡Busque y reporte vacas enfermas!

Use Guantes

Manos limpias, secas y sanas minimizan la transferencia de bacterias que causan mastitis. Use guantes plásticos o de látex para minimizar el área donde las bacterias pueden esconderse.

Pre Ordeño

Identifique señales de mastitis. Tire 2-3 chorros de leche al piso para su evaluación. Despunte suavemente y asegúrese que cada cuarto este en buenas condiciones.



Pre Sellado

Use desinfectante, espumas o aerosol. Las tetas (pezón) deben ser cubiertas completamente con desinfectante. Este líquido debe permanecer en contacto con el pezón por 20-30 segundos.

Limpie y Seque

Con movimientos circulares descendentes, remueva suavemente la tierra y el desinfectante. De vuelta a la toalla y limpie la punta de las tetas.



Conecte las Unidades

Conectar las unidades de 60-120 segundos después del primer estímulo maximizará el tiempo de liberación de la leche. Asegúrese que las pezoneras estén alineadas con la base de la ubre.

Sellado

Con un sellante de alta calidad cubra cada teta. Esto elimina la película de leche que queda en el pezón, reduciendo el desarrollo de bacterias, mejorando la condición de la piel y sellando la punta de la teta.



Aprende más hoy en Alltech.com/on-farm-support

Alltech.com/on-farm-support AlltechNaturally @Alltech
©2018. Alltech, Inc. All Rights Reserved. US_DA_OnF_po1.2

Alltech®