Alltech®
ON-FARM SUPPORT

Etapas del parto

1. Observaciones

- Se requieren observaciones periódicas para determinar el progreso del parto, y cuándo y cómo proporcionar asistencia o buscar ayuda de un veterinario.
- Siga el progreso del parto en una hoja de registro.
- Asegúrese de que el personal actualice a otros en los cambios de turno.

2. Aislamiento

Un comportamiento variable como el aislamiento ocurrirá en la mayoría de las vacas. Las vacas mostrarán algunos cambios en el comportamiento hasta que comience el proceso del parto: malestar, inquietud, etc.

3. Parto

Etapa 1: Dilatación

Esta etapa, que dura de 6-8 horas en promedio (puede ser un par de horas más en novillas), comienza con la dilatación y contracciones iniciales del parto. La vaca puede mostrar signos de malestar al patear su vientre y volverse inquieta debido a las contracciones. Algunos signos clínicos en esta etapa son: cola levantada, descarga sangrienta, descarga de líquidos. Sólo observe a la vaca y su progreso.

Etapa 2

En esta etapa, que dura de 1-2 horas en promedio para las vacas y de 2-4 horas en promedio para las novillas, el cérvix está completamente dilatado, la vaca tal vez se acueste, las contracciones aumentarán y las contracciones abdominales son obvias. El inicio de esta etapa comienza cuando el becerro pasa el cérvix y entra en el canal de nacimiento con una bolsa de agua visible en frente del becerro. Esta etapa finaliza con el nacimiento del becerro.

Etapa 3

En esta etapa la placenta o las membranas fetales son eliminadas. Esta etapa dura hasta 24 horas. Si han pasado mas de 24 horas se considera como membranas fetales retenidas (RP).

Si asiste:

- Lave la vulva y el área perineal con jabón desinfectante antes de asistir. Repita siempre si la vaca defeca.
- Utilice guantes limpios, descartables, de manga larga.
- Determine la presentación, la posición y la postura del feto.
- Corrija la presentación antes de realizar una extracción forzada.
- Utilice abundante lubricante para asistir el parto.
- Utilice cadenas y equipos obstétricos limpios y desinfectados.
- Utilice una colocación apropiada de la cadena con un doble nudo, la cadena en la parte superior de las patas.
- Toda tracción ejercida sobre el becerro debe coincidir con la madre cuando tenga una contracción y cuando empuje.
- Por favor sea paciente.
- Si no hay progreso dentro de ½ hora, llame para pedir ayuda.

Cuándo asistir:

- Si no hay progreso normal en la etapa 2.
- Si el becerro no ha nacido en 65 minutos después de la aparición del saco amniótico o después de que las patas se hayan visto fuera de la vulva.
- Cuando una postura anormal es evidente.
- En presentaciones al revés.

BIOPLEX® SEL-PLEX®

Minerales para fertilidad, salud y rendimiento.

Alltech®

Alltech.com/on-farm-support AlltechNaturally @Alltech

© Alltech, Inc. All Rights Reserved. US_DA_OnF_po7.1