

CUIDADO APROPIADO PARA BECERROS NO AMBULATORIOS

PREVENCIÓN

1. Proporcionar **calostro**, sustitutos de leche, alimento y agua de **alta calidad** en volúmenes suficientes y de **manera oportuna** para la prevención de enfermedades.
2. **Aloje animales en grupos de edad y tamaño similares.** Los animales más grandes pueden dañar a los becerros más pequeños e impedir su acceso a los recursos. Los becerros mayores también pueden transmitir gérmenes a los becerros más jóvenes.
3. Mantener las instalaciones de manera que la ventilación, densidad de población y cama estén en un **ambiente limpio**.
4. Maneje siempre a los animales de **manera silenciosa**, utilizando técnicas de manejo de bajo estrés.
5. Garantizar que la **salud** de los becerros sea monitoreada **diariamente**.
6. Trabaje con su **veterinario** para desarrollar **protocolos de sanidad y entrenamiento** sobre la detección temprana.



PLAN


1. Identificar y capacitar a **un equipo de personas** para que sean notificadas y muevan adecuadamente a los becerros **no ambulatorios**.
2. Tener un **protocolo escrito** para animales no ambulatorios.
3. Utilizar los recursos que en encuentran en calfcareqa.org
4. Garantizar que los cuidadores estén capacitados en técnicas de eutanasia humanitaria, incluida la toma de decisiones oportuna.

CUIDADO

1. Mueva al becerro a un **área separada** donde pueda ser **evaluado, monitoreado y tratado fácilmente**.
2. Proporcionar **cama, agua y alimentos limpios y secos**.
3. Realizar un **examen físico** para determinar por qué el animal no puede mantenerse de pie. Consulte a un **veterinario** en caso de ser necesario.
4. **Siga los protocolos** desarrollados con la ayuda de su veterinario para el **tratamiento** de enfermedades.
5. **No transporte** animales no ambulatorios.
6. Tome una **decisión oportuna** para **trasladarlo, tratarlo** o aplicarle la **eutanasia**.

Estos animales son vulnerables y pueden sentir dolor; requieren un manejo especial para facilitar su recuperación.

Cada hora que un animal no sea ambulatorio reduce las posibilidades de su recuperación.



¿Qué Puedes Monitorear?

SIGNOS DE DAÑO FÍSICO

Fracturas de huesos y/o extremidades, laceraciones, pinchazos, sangrado.

SIGNOS DE ENFERMEDAD

Secreción nasal, tos, aumento en la frecuencia respiratoria, diarrea, ombligo hinchado, malestar en las articulaciones.

TEMPERATURA RECTAL

Normal es < 103°F.

HIDRATACIÓN

Confirmar que el globo ocular se encuentre dentro de órbita.

CONDICIÓN CORPORAL

Los animales deben tener cobertura corporal alrededor de la cabeza de la cola y la región de las costillas cortas. Los huesos de la espalda, los ganchos y los isquiones no deben ser pronunciados.

¿SE RECUPERARÁN?

Considerar si el becerro puede ser tratado con una buena probabilidad de recuperación, o si debemos optar por la eutanasia.



CALF CARE & QUALITY ASSURANCE



Funded in part by the Beef Checkoff

